

使用上の注意改訂のお知らせ

'18-N o. 2

2018年12月

緑内障・高眼圧症治療剤<チモロールマレイン酸塩>製剤

リズモン[®]IG点眼液0.25%

リズモン[®]IG点眼液0.5%

緑内障・高眼圧症治療剤<チモロールマレイン酸塩>製剤

チモロール点眼液0.25%「わかもと」

チモロール点眼液0.5%「わかもと」

わかもと製薬株式会社

この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたのでお知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。
なお、流通在庫の関係から、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日時を要しますので、何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。

記

1. 改訂内容（部：改訂箇所）

改訂後			改訂前		
【使用上の注意】 3. 相互作用 (中略) 併用注意（併用に注意すること）			【使用上の注意】 3. 相互作用 (中略) 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
オミデネパグ イソプロピル	結膜充血等の眼炎 症性副作用の発現 頻度の上昇が認め られた。	機序不明	アドレナリン、 ジピペフリン塩 酸塩	散瞳作用が助長さ れたとの報告があ る。	
アドレナリン ジピペフリン塩 酸塩	散瞳作用が助長さ れたとの報告があ る。	機序不明	(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)			

2. 改訂理由

○自主改訂

類薬に準じて、下記内容について注意喚起致します。

相互作用相手薬の記載と整合性を図るため、「3. 相互作用」併用注意の項に、オミデネパグ イソプロピルとの併用に関する記載を追記致しました。

また、同項におけるアドレナリン、ジピペフリン塩酸塩の薬剤名等および機序・危険因子の記載整備を行いました。

≪改訂内容は、日本製薬団体連合会発行の医薬品安全対策情報（DSU）No.275（2018年12月）に掲載される予定です。

改訂後の添付文書は、医薬品医療機器情報提供ホームページ（<http://www.pmda.go.jp>）並びに弊社ホームページ（<http://www.wakamoto-pharm.co.jp/mpc/>）に掲載しております。≫



WAKAMOTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.