

リズモン[®]TG点眼液0.25%

リズモン[®]TG点眼液0.5%

を使用されている方へ

この目薬は、緑内障・高眼圧症治療薬です。
医師または薬剤師の指示どおりにお使いください。



5mL容器に2.5mLの薬液が入っているため、液量が少なく見えます。この目薬は、目の表面温度に反応してゼリー状に変化(ゲル化)することで、薬の効果を持続させる工夫をしています。そのため、点眼後にべたつくことがあります。

点眼のしかた

- 点眼する前には手をきれいに洗いましょう。
- 他の目薬も併用する場合には、他の目薬を先に点眼し、少なくとも**10分以上**の間隔をあけて、この目薬を**最後に**点眼してください。
- 1日1回1滴** 点眼してください。

点眼するとき、容器の先端が目、まぶた、まつ毛に触れないように注意してください。



<点眼し忘れた場合>

- ・その日のうちであれば、すぐに1回分を点眼してください。
- ・翌日に気づいた場合は、前日の分は点眼せず、通常どおり1日1回1滴点眼してください。

- 点眼後、目からあふれた目薬は、ぬらしたティッシュ等ですぐにふき取ってください。

- 点眼後は静かにまぶたを閉じ、1~5分間、目頭を軽く押さえてください。(薬液が鼻や口などに流れるのを防ぎます。)



保存のしかた

- 投薬袋に入れて、冷蔵庫（10℃以下）で保存してください。（凍らせないでください。）
- あたたかい場所や長時間室温におくと、ゼリー状に変化することがあります。（ゼリー状に変化しても、品質に問題はありません。）



<ゼリー状に変化した場合は>

冷蔵庫で30分以上冷やしてください。

- 開封後は、1ヵ月以内に使用してください。

点眼後の注意

- 点眼後に何か異常を感じたときは、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

毎日忘れずに点眼しましょう。

医療機関名



わかもと製薬株式会社