

# エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「わかもと」 を使用されている方へ

この目薬は、アレルギー性結膜炎の治療薬です。  
医師または薬剤師の指示どおりにお使いください。



## 点眼のしかた

●点眼する前には手をきれいに洗いましょう。

●1日4回、1回1滴 点眼してください。




治療期間中は、かゆみが起こらないようにするために、用法・用量どおり点眼しましょう。

点眼するとき、容器の先端が目、まぶた、まつ毛に触れないように注意してください。

<点眼し忘れた場合>

- ・気がついたとき、すぐに1回分を点眼してください。  
ただし、次に点眼する時間が近い場合には忘れた分は点眼せず、次の点眼時間に1回分を点眼してください。



●点眼後、目からあふれた目薬は、ぬらしたティッシュ等ですぐにふき取ってください。

●他の目薬も併用する場合には、5分以上の間隔をあけてから点眼してください。

## 保存のしかた

- 投薬袋に入れて、室温(1～30℃)で保存してください。
- 開封後は、1ヵ月以内に使用してください。

## 点眼後の注意

- 点眼後に何か異常を感じたときは、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

**指示どおりに点眼しましょう。**

医療機関名



**わかもと製薬株式会社**