

オロパジン点眼液0.1%「わかもと」

を使用されている方へ

この目薬は、アレルギー性結膜炎の治療薬です。
医師または薬剤師の指示どおりにお使いください。



点眼のしかた

- 点眼する前には手をきれいに洗いましょう。
- 1日4回、1回1～2滴 点眼してください。



点眼するとき、容器の先端が目、まぶた、まつ毛に触れないように注意してください。

<点眼し忘れた場合>

- ・気がついたとき、すぐに1回分を点眼してください。
ただし、次に点眼する時間が近い場合には忘れた分は点眼せず、次の点眼時間に1回分を点眼してください。



- 点眼後、目からあふれた目薬は、ぬらしたティッシュ等ですぐにふき取ってください。
- 点眼後は静かにまぶたを閉じ、1～5分間、目頭を軽く押さえてください。(薬液が鼻や口などに流れるのを防ぎます。)
- 他の目薬も併用する場合には、5分以上の間隔をあけてから点眼してください。
- コンタクトレンズを装用している場合は、レンズを外して点眼し、10分以上経過してからレンズをつけてください。



保存のしかた

- 投薬袋(遮光袋)に入れて、室温(1～30℃)で保存してください。
- 開封後は、1ヵ月以内に使用してください。

点眼後の注意

- 目が痛い、目やまぶたが赤くなる、目やまぶたの周りが腫れる、目やまぶたがかゆい、頭痛がするなどの症状があらわれた場合は、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。
- 点眼後に何か異常を感じたときは、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

指示どおりに点眼しましょう。

医療機関名



わかもと製薬株式会社